

Spray Iodine

Désinfectant avant la traite Prêt à l'emploi

1. PROPRIETES :



Produit utilisable en agriculture biologique *.

SPRAY IODINE, appliqué avant chaque traite, va permettre en première action de **désinfecter** le trayon, et d'éviter les contaminations du lait par les bactéries, les levures et bactériophages lors du contact avec les faisceaux.



SPRAY IODINE, va en deuxième action et à chaque application permettre **d'assouplir le pis** pour le préparer à la traite et à la montée de lait.
Adapté à un usage en pulvérisation automatique, en robot de traite.



Un produit BIOCIDE efficace, **bactéricide, levuricide et bacteriophage**, apportant la garantie d'une peau saine. *Voir le tableau de synthèse en efficacité.*

La formule est autorisée sous SIMMBAD sous le N°41828.

SPRAY IODINE est autorisé sur le marché sous le N° AMM FR-2019-0061-01-01, conformément au règlement Biocide 528/2012 en TP3. Conforme au règlement européen agriculture biologique CE 834/2007 (et ses amendements).

2. MODE D'EMPLOI :

Lire l'étiquette avant utilisation et respecter toutes les instructions fournies.

SPRAY IODINE est prêt à l'emploi. S'utilise à température ambiante > 5°C et < 20°C. (Pis entre 38,5 et 39,2°C).

Nettoyer soigneusement les trayons avant l'application du produit :

> En pulvérisation automatique en robot de traite :

- Mettre le produit en oeuvre selon les préconisations du fabricant de matériel.
- Activer la pulvérisation automatique.
- Vérifier le réglage du matériel pour que chaque trayon soit entièrement recouvert de produit pendant une minute, temps nécessaire à l'action désinfectante sur la peau.
- Vérifier le réglage du matériel pour que le produit soit éliminé des trayons avant le branchement des faisceaux.
- Séchage automatique par jet d'air.
- Pas de rinçage à l'eau avant le branchement des faisceaux.

> Avec un gobelet de trempage de 300 ml :

- Remplir le gobelet propre et sec au 3/4 (225 ml).
- Exercer un nombre suffisant de pressions (3 à 6 environ) pour faire monter le produit dans le réservoir et le remplir jusqu'au 2/3.
- Tremper chaque trayon avant la traite, puis après une minute, temps nécessaire à l'action désinfectante du produit sur la peau, essuyer soigneusement avec une lavette propre en coton ou un papier d'essuyage à usage unique, le trayon et la base de la mamelle.
- Pas de rinçage à l'eau avant le branchement des faisceaux.

Après le temps de contact, séchez les trayons et la base du pis avec une serviette en coton propre ou une serviette en papier jetable pour les autres modes d'application.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide fluide marron
pH :	4 +/- 1
Densité :	1.02 +/- 0.02
Point de gel :	< 0 °C
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel, entre 5 et 15°C.
TP :	TP3 : Désinfection des trayons hors usage médicament vétérinaire. AL – Liquide destiné à être utilisé sans dilution.
Substance active :	PVPi Polyvinylpyrrolidone iodine (CAS N°25655-41-8) = 29 g/kg, soit 2,6 g/kg d'iode disponible ou 2600 ppm.

4. CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de propreté à 30°C spécial trayon (3 g/l d'albumine bovine) :

	Normes efficacité	Temps de contact
<i>Staphylococcus aureus</i> *	EN 1656 EN 16437	1 min
<i>Escherichia coli</i> *		
<i>Streptococcus uberis</i> *		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
<i>Salmonella typhimurium</i>		
<i>Enterobacter cloacae</i>		
<i>Lactibacillus brevis</i>		
<i>Proteus vulgaris</i>		

Souches obligatoires *

Efficacité levuricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté spécial trayon (10 g/l lait) :

Souches	Normes efficacité	Temps de contact
<i>Candida albicans</i> *	EN 1657 EN 16437	1 min

Souches obligatoires *

Efficacité bactériophage :

Souches	Normes efficacité	Temps de contact
<i>Bactériophage P001</i> <i>Bactériophage P008</i>	EN 13610	1 min

5. CONDITIONNEMENTS :

Disponible en :

- Bidon de 20kg – 001111802

- Fut de 60kg – 001111803

Le pictogramme EVPHEL, présent sur le produit, indique que l'emballage usagé peut-être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.

6. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1118) : + 33 (0)3 83 22 50 50,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Produit contenant des dérivés de pyrrolidones. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. * Produit utilisable en agriculture biologique conforme au (UE) 2018/848 (et ses amendements).

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

En cas d'inefficacité, veuillez remonter le problème au détenteur de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) : infobiocide@b2f.fr.

N° de révision : 31/05/2023(V2.3)1118.ind1