

Ovicap'Spray

Hygiène et protection des trayons, pulvérisation après la traite.

1. PROPRIÉTÉS :



Produit utilisable en agriculture biologique *.



Ovicap'Spray est un produit liquide prêt à l'emploi, à base de CHLORHEXIDINE. S'utilise en pulvérisation manuelle, semi-automatique ou automatique, peut également s'utiliser en trempage liquide.



La pulvérisation de chaque trayon avec Ovicap'Spray et protection optimale visible à l'œil nu. Contient de l'essence de citronnelle.



La formule innovante d'Ovicap'Spray combine des agents adoucissants et surgraissants utilisés habituellement pour la formulation de produits cosmétiques :

- du gel d'Aloé Vera, reconnu pour ses vertus de régénération cellulaire, qui renforce l'épiderme et prévient les lésions cutanées.
- de la glycérine, qui améliore la fonction de barrière cutanée et l'élasticité de la peau.



Les caractéristiques de la substance active biocide, confèrent un pH neutre à la formulation de l'Ovicap Spray, convenant aux peaux délicates de certaines races et limitant la formation de gerçures et de crevasses.



Ovicap'Spray assure la protection microbienne des trayons tout en leur donnant douceur et souplesse. Ovicap'Spray est bactéricide (efficace sur les bactéries responsables des mammites) et levuricide, selon les normes en vigueur.

2. MODE D'EMPLOI :

Immédiatement après la traite :

Pulvériser Ovicap'Spray pur sur chaque trayon, veiller à bien répartir le produit sur chaque trayon.

Ne pas essuyer, ne pas rincer, laisser agir au moins 5 minutes (temps nécessaire à la désinfection).

Éliminer les résidus de produit s'il y a lieu au début de la traite suivante, à l'aide d'une lavette unique imprégnée d'une solution nettoyante.

3. CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

Souches	Norme	Temps de contact
<i>Escherichia coli</i>	EN 1656	5 minutes
<i>Staphylococcus aureus</i>		
<i>Streptococcus uberis</i>		

Efficacité levuricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité (lait écrémé à 10 g/l) à 30°C

Souche	Norme	Temps de contact
<i>Candida albicans</i>	EN 1657	5 minutes

Efficacité bactéricide, produit prêt à l'emploi, en condition de saleté après-traité à 30°C

Souches	Norme	Temps de contact
<i>Escherichia coli</i>	EN 17422	5 minutes
<i>Staphylococcus aureus</i>		

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide violet
pH :	6,50 +/- 1,00
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.
TP :	TP03 - désinfection des trayons hors usage médicament vétérinaire. AL - Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution
Substance active :	CHLORHEXIDINE GLUCONATE (N° CAS : 18472-51-0) à 5 g/kg.
N° de déclaration à l'inventaire BioCID	N° 66450.

5. CONDITIONNEMENTS :

Disponible en :

- Bidon de 10 kg. Réf. 001102606.
- Bidon de 20 kg. Réf. 001102607.

Le pictogramme ADIVALOR, présent sur le produit, indique que l'emballage usagé peut être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière EVPHEL.

6. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre antipoison Européen (PCN). Réf.1026.

N° de téléphone d'appel d'urgence ORFILA : 01 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

**Produit utilisable en agriculture biologique conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements).*

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Ne pas mélanger avec d'autres produits désinfectants.

N° de révision 22.07.25(V1.1)